

FlowSecure™

Künstlicher Blasenschließmuskel

Einstellung des Systemdrucks

WICHTIGE HINWEISE

Beim injizieren die Wände der Pumpe nicht mit der Nadel beschädigen!
Die Nadel immer parallel zu den Pumpenwänden führen!

Nur kurze Nadeln verwenden!
Empfohlen: 25G 5/8" (0,5 x 16 mm), orange

Benötigtes Material

- Steriler Verbandstoff
- Sterile Handschuhe
- Desinfektionsmittel, z.B. Chlorhexidingluconat-Lösung
- Sterile isotonische Kochsalzlösung (NaCl 0,9%)
- Sterile Spritze 10 ml
- Sterile Nadel, 25G 5/8" (0,5 x 16 mm), orange

Durchführung

1. Lagerung des Patienten

Bringen Sie den Patienten in die Rückenlage.

2. Spritze vorbereiten

Benötigtes Volumen an Kochsalzlösung in die 10 ml Spritze aufziehen.

3. Reinigung und Desinfektion

Hinweis: Aufgrund der besonderen Gegebenheiten im Aktionsbereich muss eine extrem sorgfältige Desinfektion durchgeführt werden

4. Injektionsstelle vorbereiten

- Pumpe ergreifen und die Haut straff über das Ende der Pumpe (Injektionsport) ziehen.
- Desinfektionsmittel an der Injektionsstelle mit Kochsalzlösung entfernen.
- Trocknen der Injektionsstelle

5. Injektionsvorgang

- Entlüften der Spritze
- Spritze ansetzen (zentriert zum Port und parallel zum Pumpenkörper)
- Nadel durch die Haut, **nicht in die Pumpe**, stechen.
Um Gewebe- und Blutpartikel aus der Nadelspitze zu entfernen, 0,1 ml NaCl-Lösung zwischen Haut und Port spritzen.
- Nadel durch den Port in die Pumpe stechen und darauf achten, dass die Nadel immer parallel zum Pumpenkörper ausgerichtet bleibt.
- Benötigtes Volumen injizieren und Nadel entfernen

